

Septo-pack

Инструкция по применению

Состав: амилацетат, бутилфталат, окись цинка, сульфат цинка, наполнитель

Свойства:

Пластичная самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей массе. В качестве нейтральной основы эта паста также может быть использована вместе с некоторыми лекарственными препаратами, способствуя удержанию их на месте на уровне десны, зуба или альвеолы.

Показания:

Сохранение стерильности после обработки зуба: временное пломбирование, ретракция десны перед пломбированием при кариозных дефектах в пришеечной области зуба

Подготовительный этап перед снятием оттисков: ретракция десны

Периодонтология: лечебно-защитный компресс при локальной форме периодонтита

Препарат может применяться вместе с другими лекарственными средствами в следующих случаях при хирургических вмешательствах в полости рта: защитный компресс на альвеолы после удалений, гингивэктомии и других вмешательствах.

Способ применения:

Общие пояснения: при работе с данными препаратами пользоваться только сухим и стерильным шпателем; взятому этим инструментом небольшому количеству пасты, в зависимости от последующего применения следует придать либо конусовидную, либо шарообразную форму. При этом на препарат не должна попадать влага. Необходимо тщательно закрывать баночку после каждого использования. В полости рта паста остается пластичной лишь в течение 2 – 3 минут после нанесения на обрабатываемый участок. Она затвердевает примерно за 30 минут.

Сохранение стерильности после обработки зуба.

Постановка временной пломбы: особенно при пломбировании (как поверхностном, так и глубоком кариесе) полостей: полость просушить теплым воздухом. Запломбировать. Для удаления этой пломбы целиком, без дробления на отдельные кусочки, следует пользоваться экскаватором.

Ретракция десны:

Паста Septo-pack очень эффективна для ретракции десны на уровне шейки зуба, как перед препарированием кариозной полости в пришеечной области и, особенно, перед пломбированием, так и перед снятием оттисков. За 24 – 48 часов до лечения или снятия оттисков поместить Septo-pack на обрабатываемый участок, проталкивая пасту между зубом и десной.

Периодонтология

Этот препарат легко вводится между зубом и краем десны и проталкивается в межзубный промежуток. Смешанный с несколькими каплями препарата Floucal и нанесенный на чувствительные шейки зубов на 48 часов, Septo-pack снимает болезненные ощущения на несколько месяцев. Препарат образует защитный компресс при лечении локального периодонтита. Предохраняет лечебные пасты от действия слюны.

Препарат образует защитный компресс после гингивэктомии: после тампонирувания обрабатываемого участка небольшое количество пасты, которой придана конусовидная форма, и размером с обрабатываемый участок, ввести, заполняя ею межзубной промежуток. Необходимо следить за тем, чтобы повязка не выходила за пределы оперируемой поверхности. Рекомендуется для удобства пациента каждые два-пять дней менять компресс.

Хирургические вмешательства в полости рта

Для использования Septo-pack в качестве альвеолярного компресса после удаления зубов необходимо приготовить из этого препарата шарик, который затем будет помещен в лунку. Шарик покрыть большим ватным тампоном и сказать больному, чтобы он на пять минут сжал зубы. Удалить тампон и оставить пасту в лунке без наложения шва. Пасту удалить через четыре дня.

Внимание! Рекомендуется нанести тонкий слой вазелина на стенки сформированной полости перед тем, как ввести туда Septo-pack. Это упростит удаление временной пломбы и последующее пломбирование. Перед окончательным пломбированием полость обработать хлороформом.

Упаковка: баночка, содержащая 60 г пасты.